




T.C.  
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ  
DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ  
ACIL TIP ANABİLİM DALI  
ERİŞKİN TAŞIKARDİ (NABIZLI) ALGORİTMASI

DOKÜMAN NO: AS.YD.01  
İLK YAYIN TARİHİ:04.09.2017  
REVİZYON NO: 02  
REVİZYON TARİHİ:23.08.2022  
SAYFA NO: 1/1

Yetişkinlerde Taşikardi (Nabızlı)



**DOZLAR/AYRINTILAR**

**Başlangıç dozu**

Dar QRS düzenli...50-100 Joule

Dar QRS düzensiz...120-200 J  
Bifazik veya 200Jmonofazik

Geniş QRS düzenli...100 J

Geniş QRS düzensiz...

Defibrilasyon(senkron değil)

**ADENOZİN IV Dozu**

6mg IV 1-2 sn'de

Yanıt yoksa 12mg IV

Hemen arkasından SF bolus

**Geniş QRS'li taşikardide antiaritmik infüzyonu**

**Prokainamid IV Dozu**

20-50mg/dk; aritmi baskılanıncaya, hipotansiyon, QRS süresinde  $>50\%$  artış, veya maksimum doz 17mg/kg oluncaya kadar

İnfüzyonu 1-4mg/dk

Uzamış QT veya KKY'de kaçının

**Amiodaron IV Dozu**

150mg 10dk'da IV infüzyon

Gerekliyse tekrar et

İnfüzyon dozu 1mg/kg 6 saatte

**Sotalol IV Dozu**

100mg (1.5mg/kg) 5dk'da

Uzun QT'de kaçın